

# ASPECTOS CLÍNICOS MAS RESALTANTES DEL DENGUE

# FORMAS

Puede ser:

- Las infecciones asintomáticas
- Fiebre del dengue
- Fiebre Hemorragica del dengue y
- Síndrome de shock por dengue

# FORMAS

- El comienzo es repentino con fiebre alta (a menudo del tipo silla de montar), escalofrío, molestia intensa ("rompehuesos") de cabeza, espalda y extremidades, acompañada de dolor de garganta, postración y depresión.

# FORMAS

- La fase febril inicial dura de 3 a 4 días y de manera típica y va seguida de una remisión de unas horas a dos días y se acompaña de síntomas similares, pero por lo general más leves que los de la primera fase.


# FORMAS

- El exantema puede ser escarlatiforme, mobiliforme, maculopapular y petequial. Se presenta primero en el dorso de las manos y de los pies y se disemina a brazos, piernas, cuello y tronco, pero rara vez a la cara. Dura unas cuantas horas o unos días y puede ir seguido de descamación.

# DIAGNOSTICO

- El diagnóstico suele ser difícil al principio y no se puede diferenciar del paludismo, la fiebre amarilla y la influenza. Recordar siempre preguntar por el nexo epidemiológico (**provenir de zonas endémicas**). Una vez que aparece el exantema que se asemeja a la rubéola, el diagnóstico suele ser fácil.

# FIEBRE HEMORRAGICA DE DENGUE EN LAS AMERICAS



\* Hasta marzo 2000

\*\* Cuatro de estos países registraron casos de FHD durante 1981-1998

# GRADOS DE SEVERIDAD DEL DENGUE HEMORRÁGICO

**GRADO I:** Fiebre acompañada de síntomas inespecíficos, la única manifestación hemorrágica es la prueba de torniquete positivo.

**GRADO II:** Sangrado espontáneo además de las manifestaciones de los pacientes en el grado I, generalmente la forma de sangrado en zonas de venipuntura.

**GRADO III:** Insuficiencia circulatoria manifestado por el pulso rápido débil, reducción de la presión e hipotensión con piel pegajosa y fría.

**GRADO IV:** Choque profundo con presión sanguínea y pulso no detectables.

La trombocitopenia con hemoconcentración intercurrente marca la diferencia entre los grados I y II del dengue hemorragico con el dengue clásico.



# EVOLUCIÓN DE LA SEVERIDAD DEL DENGUE

## **ETAPA FEBRIL:**

**de 0 a 48 horas, con fiebre, exantema, cefalea, discreto dolor abdominal, dolor retroocular, diarrea (infrecuente), dolor muscular y de articulaciones.**

**al final del 2do día e inicio del 3er día (aparecen algunos transtornos hemorragíparos), prueba de torniquete positivo, petequias, sangrado por venipuntura, epistaxis, hematuria, gingivorragia, vómitos con sangre.**

## **ETAPA CRÍTICA: 3 a 5 días en niños, 4 a 6 días en adultos**

**Aparente mejoría, luego ascitis, dolor abdominal, vómitos (más frecuentes), derrame pleural, elevación del hematocrito.**

**Shock aun sin evidencia de sangrado.**

## **ETAPA DE RECUPERACIÓN: el sangrado y los derrames disminuyen hasta desaparecer, se incrementa la diuresis y la afectación cardiovascular se normaliza.**

**Evolución visceral: infrecuente pero se da con encefalopatía, insuficiencia hepática aguda y miocardiopatía aguda**