


**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA
ATENCION DE SALUD (IAAS) – PRIMER SEMESTRE 2017
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
ÁREA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS IAAS**



INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADO A CATÉTER VENOSO CENTRAL - NEONATOLOGÍA - I SEMESTRE 2014 - 2017-HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental ÁreaVPC de las IAAS - HHU

COMENTARIO

Se observa en el gráfico que la tasa más elevada del primer semestre 2017, se presenta en mayo con 17.4 X 1000 días de exposición siendo a la vez la tasa más alta desde el 2014; ubicándonos sobre los niveles del promedio general y de hospitales de categoría 3 -1

INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADO A CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO - NEONATOLOGÍA - I SEMESTRE 2014 - 2017 - HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO

El gráfico nos muestra que la tasa de ITS asociado a catéter venoso periférico, ha sufrido un incremento en el mes de enero 2017 con 2 ITS y una tasa de 5.8 X 1000 días de exposición, teniendo luego una notable caída en los últimos cuatro meses del primer semestre, situándonos por debajo del promedio nacional y de hospitales de categoría 3 -1.

NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR MECÁNICO NEONATOLOGÍA - I SEMESTRE 2014 - 2017 --HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO

En el gráfico vemos que desde febrero del 2,016 hubo silencio epidemiológico, presentando en junio del 2017 1 NAVM con una tasa de 5.3 X1000 días de exposición, situándonos ligeramente sobre los indicadores de promedio nacional y de hospitales de categoría 3-1.

INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADO A CATETER VENOSO CENTRAL UCI - I SEMESTRE 2014 - 2017 - HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS -HNHU

COMENTARIO

Como se observa, la tasa de ITS asociado a catéter Venoso Central en el primer semestre 2017, luego de un silencio epidemiológico ha presentado 1ITS en junio con una tasa de 5.8 X 1000 días de exposición, situándonos sobre los indicadores de Promedio Nacional y de hospitales de categoría 3-I.

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO ASOCIADO A CATÉTER URINARIO PERMANENTE UCI - I SEMESTRE 2014 - 2017 - HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO

El gráfico nos muestra que la ITU asociado a catéter urinario permanente, en el primer semestre de los años 2014 y 2015 han tenido un silencio epidemiológico y desde el año 2016 la tasa se ha incrementado, en enero del año 2017 hubo 2 ITU con una tasa de 11.8 X 1000 días de exposición descendiendo hasta el mes de junio; en relación a los indicadores nos encontramos sobre el nivel nacional y de hospitales de categoría de nivel 3-1.

NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR MECANICO UCI - I SEMESTRE 2014 - 2017 - HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO

Se observa en el gráfico que en el primer semestre 2017, la tasa de NAVM comparativamente con los semestres de años anteriores se ha mantenido elevada y con un marcado descenso; situándonos aún sobre los indicadores de nivel nacional y de hospitales de categoría 3-1.

ENDOMETRITIS PUERPERAL ASOCIADA A PARTO VAGINAL GINECO OBSTETRICIA - I SEMESTRE 2014 - 2017 -HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HN

COMENTARIO

Se observa en el gráfico que el año 2016 ha tenido la mayor ocurrencia de endometritis asociada a parto vaginal, vemos que en el primer semestre del 2017, se han presentado 2 endometritis y las tasas comparativamente con el año anterior no han variado; en relación a los indicadores nos situamos sobre el de nivel nacional y de hospitales de categoría 3-1.

ENDOMETRITIS PUERPERAL ASOCIADA A PARTO CESÁREA GINECO OBSTETRICIA - I SEMESTRE 2014 - 2017 -HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental .Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO

El gráfico nos muestra que la tasa de endometritis asociadas a parto por cesárea, en el primer semestre 2017 comparativamente con los años anteriores se ha elevado, presentando en abril 3 endometritis con una tasa de 1.4 X 100 procedimientos; situándonos frente a los indicadores sobre el de nivel nacional y el de categoría 3-1.

INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA ASOCIADA A PARTO POR CESÁREA GINECO OBSTETRICIA - I SEMESTRE 2014 - 2017 -HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental -Área de VPC de las IAAS- HNHU

COMENTARIO

El gráfico muestra que la IHO asociada a parto por cesárea, en abril del primer semestre 2017 ha presentado 6 IHO con una tasa de 2.8 X 100 procedimientos, con marcado descenso hasta el mes de junio, comparativamente con los semestres de años anteriores presentó la tasa más elevada, en relación a los indicadores nos ubicamos bajo el de nivel nacional y hospitales de categoría 3-1.

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO ASOCIADO A CATÉTER URINARIO PERMANENTE MEDICINA - I SEMESTRE 2014 - 2017- HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO

Se observa que la ITU asociada a catéter urinario permanente, comparativamente con los años anteriores el primer semestre 2017, presenta la más bajas tasas; nos ubicamos frente a los indicadores bajo el de nivel nacional y hospitales de categoría 3-1.

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO ASOCIADO A CATÉTER URINARIO PERMANENTE - CIRUGÍA GENERAL - I SEMESTRE 2014 - 2017 -HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología Y Salud Ambiental -Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO

Se observa que la ITU asociada a catéter urinario permanente en el primer semestre del año 2017 después de 5 meses de silencio epidemiológico, en abril ha presentado 1 ITU con una tasa de 6.5 X 1000 días de exposición; frente a los indicadores nos encontramos sobre el de nivel nacional y de hospitales de categoría 3-1. Cabe mencionar que esta infección es el indicador de compromiso de gestión para el año en curso por lo que no puede haber más ITU durante el año para cumplir en la tasa anual con la meta indicada, como dato fue el indicador en el año 2016 y se cumplió la meta de reducir esta infección en 30%.

INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA ASOCIADA A COLECISTECTOMÍA CIRUGÍA GENERAL - I SEMESTRE 2014 - 2017 -HNHU




Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO

El gráfico muestra que la IHO asociada a colecistectomía desde el primer semestre del año 2014 hasta el 2017, se mantiene en silencio epidemiológico; frente a los indicadores nos encontramos bajo el de nivel nacional y hospitales de categoría 3-1.

INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA ASOCIADA A HERNIORRAFÍA INGUINAL - CIRUGÍA GENERAL - I SEMESTRE 2014 - 2017 - HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO

El gráfico muestra que la IHO asociada a herniorrafia desde el primer semestre del año 2014 hasta el 2017, se mantiene en silencio epidemiológico; frente a los indicadores nos encontramos bajo el de nivel nacional y hospitales de categoría 3-1.