


ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE


Semana Epidemiológica N° 18 hasta 26 -2017

CANAL ENDEMICO DE CASOS DE IRAS TOTAL POR AÑOS 2010 -2016 EN MENORES DE 5 AÑOS REPORTADOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA (SE 01 A 26) AÑO 2017* - HNHU




Las IRAs son la causa de morbilidad en nuestro medio, afectando a los menores de 5 años, las infecciones respiratorias agudas totales dentro del canal endémico en la SE: 18 al 27 se han mantenido en zona de éxito con excepción de la SE 24 que se encontraba en zona segura, debido a los cambio de estación climáticos que afecta a los niños menores. En la SE 18 al 26 - 2017 se reportaron 756 episodios con respecto a las semanas anteriores, donde se notificaron 810 episodios de Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años. (Ver gráfico).

Tendencia de Infecciones respiratorias Agudas, Hospital Nacional Hipólito Unanue 2014 - 2017*




CANAL ENDEMICO DE CASOS DE NEUMONIA POR AÑOS 2010 - 2016 EN MENORES DE 5 AÑOS REPORTADOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA (SE 01 AL 26) AÑO 2017* -HNHU




Comentario: Las neumonías es la principal causa que afecta a los menores de 5 años. Así mismo en la SE 18 hasta la 26 se reporto nuevamente 7 episodios de Neumonías, encontrándose ubicados en la zona éxito, excepto la S.E 20,23 y 24 se encuentran zona de segura por haber reportado más de 2 casos, se hizo la investigación epidemiológica de los casos que fueron hospitalizados en las semanas que presento altos picos, actualmente no tenemos niños hospitalizados con neumonías.

Tendencia de Neumonias, Hospital Nacional Hipólito Unanue 2014 - 2017*




**CANAL ENDEMICO EN CASOS DE ASMA POR AÑOS 2010 - 2016
EN MENORES DE 5 AÑOS REPORTADOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA
(SE 01 A 26) AÑO 2017 *- HNHU**




Comentario: En los casos de Asma y Epoc, se observa cifras estables centrándose en la zona de éxito dentro del canal endémico de SOB/Asma, la SE 18 al 26-2017 se reportaron 359 episodios de Asma, con mayor demanda en las semanas 23 y 26, este comportamiento indica que durante estos meses el riesgo de enfermarse disminuye en forma leve en los menores de 5 años (Ver Gráfico).

Tendencia de SOB - ASMA, Hospital Nacional Hipólito Unanue 2014 - 2017*




**CANAL ENDEMICO DE CASOS DE EDA TOTAL AÑOS 2010 AL 2016
ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS REPORTADOS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA
(SE 01 AL 26) AÑO 2017* - HNHU**




Comentario: diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por muy diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua con contaminación fecal. Los casos de EDAs total, notificados y registrados fueron 305 episodios, dentro de la SE 18 hasta 26, el comportamiento endémico de las EDAs totales, se ubica entre la ZONA SEGURA. Se debe continuar fortaleciendo las actividades de prevención mediante el lavado de manos con el fin de disminuir las enfermedades gastrointestinal aguda. (ver grafico).

Tendencia de enfermedad diarreica acuosa totales, Hospital Nacional Hipólito Unanue 2016 - 2017*




CANAL ENDEMICO DE EDAS AÑOS 2009 - 2016
ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS EN MENORES DE 5 AÑOS REPORTADOS
POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA (SE 01 AL 26) AÑO 2017* - HNHU




Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) es un problema de salud, que afecta a los menores de 5 años, los factores asociados a un mayor riesgo de enfermar e incluso de morir por enfermedades diarreicas son: La higiene deficiente lavado de manos, desnutrición y Falta de capacitación de la madre para la higiene familiar para prevenir las enfermedades diarreicas que son la principal causa de morbilidad infantil en los niños menores de 5 años, dentro de las SE. 18 y 26 el comportamiento de EDAs dentro del canal endémico se ubican en zona de éxito con excepción 25 y 26 que se ubican en la zona segura.

Tendencia de enfermedad diarreica acuosa en menores de 5 años, Hospital Nacional Hipólito Unanue 2016 - 2017*




**CANAL ENDEMICO AÑOS 2010 AL 2016
ENFERMEDADES DIARREICAS (EDA) EN MAYORES DE 5 AÑOS POR
SEMANA EPIDEMIOLOGICA (SE 01 AL 26) AÑO 2017* - HNHU**




En el canal endémico las enfermedades diarreicas, dentro de la SE. 18 las EDAs se ubica en la zona de alarma, las demás semanas están en zona segura, en la SE 18 hasta 26 - 2017*, los casos de EDAs en mayores de 5 años, fueron 122 episodios de diarrea por enfermedades gastrointestinales adquiridas en la comunidad. Principalmente después de acudir a eventos o transgresiones alimentarias que pueden presentar: Salmonella, Shigella, etc. (Ver grafico).


Tendencia de enfermedad diarreica acuosa en mayores de 5 años, Hospital Nacional Hipólito Unanue 2016 - 2017*



ENFERMEDADES DE NOTIFICACION POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA AÑOS 2011 AL 2017* (SE 01 AL 26) HNHU



NUMERO DE CASOS DE SIDA Y VIH REPORTADOS EN LOS AÑOS 2012 AL 2017* HNHU SE 01 AL 26




Comentario: Dentro de las enfermedades de notificación se observa un elevado porcentaje 37% (1068 casos de SIDA), seguido por la infección VIH con 36% (1047 casos), estos casos se ubican en las etapa de vida joven y adulto. Para el año 2017* dentro de la SE 01 al 26 se reportaron 113 casos para SIDA vs. VIH, el resto de enfermedades disminuidos. (ver grafico).

NUMERO DE GESTANTES REGISTRADAS, EXAMINADAS Y CON SEROLOGÍA REACTIVA AÑO 2017* - SE 01 HASTA 26 HNHU




En el gráfico se observa que se notificaron de gestantes registradas con un porcentaje del (57%), examinándose 173 gestantes 42% con muestreo de laboratorio se obtuvo un caso positivo para sífilis con el 0.8% reportados hasta la semana epidemiológica 01 hasta 26-2017*.

PORCENTAJE DE GESTANTES REGISTRADAS, EXAMINADAS Y CON SEROLOGIA REACTIVA AÑOS 2015 -2017* SE 01 AL 26 -HNHU




COMENTARIO: En los años 2015 al 2016 los porcentajes se muestran altos entre 22 y 24% por la mayor demanda de gestantes a nuestra institución, en el año 2017* se notificaron en la SE 01 al 26 los porcentajes se encuentran disminuidos para los 3 grupos de gestantes entre (registradas, examinadas y positivas 12%) en 5 casos, además no todas las gestantes se les hace su orden para laboratorio.

Numero de Abortos Registradas, Examinadas y Positivas Según Grupo Etario Año 2017* HNHU hasta SE 01 Hasta 26




COMENTARIO.- El número de abortos notificados en la SE: 01 hasta 26, fue 691 casos de abortos, registrados 390 casos, examinadas 296 casos con muestreo por laboratorio con la fin de descarte de sífilis de éstos (5 casos) fueron positivos con el 0.7% para sífilis.

PORCENTAJE DE ABORTOS REGISTRADAS, EXAMINADAS Y POSITIVAS POR AÑOS 2015 - 2017* HNHU HASTA SE 01 HASTA 26




COMENTARIO: El porcentaje de abortos registradas oscila entre 42 a 50% para el año 2015 al 2016, en los grupos de (registradas, examinadas, positivas), para el año 2017* se observa un descenso del 19%, 20% y 41%, entre la registradas y examinadas, se registraron 5 casos de positivas, reportados hasta la SE 01 hasta 26 (ver gráfico).

PORCENTAJE DE PUERPERAS REGISTRADAS EN LOS AÑOS 2015 - 2017* - HNHU SE 01 hasta 26




COMENTARIO: En el gráfico se observa que del total (23765 casos) de puérperas registradas con 21% examinadas 23% de este grupo 15% fueron positivas en el año 2015 y 2016 (se registraron 21%, se les examinó y se obtuvo una muestra por laboratorio y de este total solo el 13% tuvo resultado positivo. En el año 2017* los casos de sífilis ha disminuido en un 10% tanto para puérperas registradas y examinadas, 3% obtuvieron resultado positivo para sífilis, notificados en la SE 01 AL 26 –2017.

PORCENTAJE DE SIFILIS CONGENITA POR AÑOS 2011 AL 2017*- SE 18 HASTA 26 HNHU




COMENTARIO.- El gráfico se observa los casos de sífilis congénita notificados entre los años 2011 y 2016, resalta que en los últimos cuatro años la sífilis se encuentra en descenso, debido a los controles que reciben en el primer nivel de atención las madres se encuentran controladas para prevenir el riesgo de tener Sífilis Congénita (ver gráfico 23).

PORCENTAJE DE MUERTE PERINATAL SEGUN PESO REPORTADOS EN EL AÑO 2017* HNHU SE: 18 AL 26




COMENTARIO.- En la vigilancia epidemiológica de casos de muerte perinatal el año 2017* se han reportado 61 muerte fetal. En la SE 18 hasta 26 se notificó 26 casos del cual 12 son por muerte fetal (58% con un peso < de 1500 gr.) , 14 casos por muerte neonatal que va en aumento (91%) se encontraban con un peso < de 1500 grs , como se observa las cifras son de preocupación.

PORCENTAJE DE MUERTE PERINATAL SEGUN PESO Y SEXO, REPORTADOS EN EL AÑO 2017* HNHU S.E 18 AL 26




PORCENTAJE DE MUERTE PERINATAL SEGUN DISTRITOS REPORTADOS EN EL AÑO 2017* HNHU S.E 18 AL 26




COMENTARIO: Las muertes perinatales según distritos de procedencia se observa que el mayor porcentaje 25% son del distrito de Santa Anita, seguido por Ate con el 21%, San Juan de Lurigancho y Lurigancho con el 12% y El Agustino están entre el 8%, los demás casos de muertes representan menor de 4%.

SITUACION EPIDEMIOLOGICA Y TENDENCIA DE MUERTE MATERNA SEGUN CLASIFICACION INICIAL SE 01 HASTA 26 HNHU - 2017*




Comentario: La Organización Mundial de la Salud define la defunción materna como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independiente de la duración, en los últimos años 2009 al 2016. Según la tendencia vemos que la muerte directa va en disminución, la muerte indirecta se notificaron 2 casos, reportados en la SE 18 hasta 26 .

ACCIDENTES DE TRANSITO SEGUN TIPO DE SEGURO AÑO 2017* NOTIFICADOS EN LA SE 01 AL 26 - HNHU




COMENTARIO: Los accidentes transito constituyen uno de los mayores problemas de la ciudad, desde el punto de vista de la salud publica como de la medicina legal, siendo una de las principales causas de mortalidad en el Perú. En el 2017 el 109% esta cubierto por el SOAT y 42%, de los accidentes es particular, 1.2% por el SIS y en convenios 0.05. (ver gráfico).

PIRAMIDE POBLACIONAL DE ACCIDENTES DE TRANSITO POR GRUPO ETARIO AÑO 2017* SE 01 HASTA 26 - HNHU



Comentario: Los accidentes de tránsito son mayores entre las edades de 25 a 29 años, seguido por las edades entre los 20 a 24 años (varones y mujeres), los accidentes de tránsito se relacionan con el consumo de alcohol y que en su mayoría son cubiertos por el SOAT, es un seguro obligatorio establecido por Ley con un fin netamente social.



PORCENTAJE DE TUBERCULOSIS SEGUN GRUPO OCUPACIONAL COMPARATIVO AL PRIMER SEMESTRE AÑOS 2000 AL 2017 HNHU.




FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL (OESA)

Comentario: El grupo ocupacional afectado, Téc. de Enfermería con 17% (13 casos), el personal de Enfermería con 14%, médico 2%, personal médico residente, téc. Nutrición e internos de medicina el 8%, personal de mantenimiento con 7%, otros en menor porcentaje. La Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, en coordinación con la Dirección General, el comité de TB, determinaron tomar acciones de mayor énfasis para prevenir y controlar la Tuberculosis; iniciando el fortalecimiento las medidas de bioseguridad ver gráfico).

CASOS DE TUBERCULOSIS SEGUN BACILOSCOPIAS PRIMER SEMESTRE AÑOS 2000 AL 2017 H.N.H.U.



CASOS DE TUBERCULOSIS SEGUN UBICACIÓN DE LA ENFERMEDAD PRIMER SEMESTRE AÑOS 2000 AL 2017 HNHU




CASOS DE TUBERCULOSIS SEGUN CONDICION DE INGRESO PRIMER SEMESTRE AÑOS 2000 AL 2017 HNHU



CASOS DE TUBERCULOSIS SEGUN ESQUEMA DE TRATAMIENTO PRIMER SEMESTRE AÑOS 2000 AL 2017 HNHU




PORCENTAJE DE TUBERCULOSIS SEGUN CONDICION LABORAL PRIMER SEMESTRE AÑOS 2000 AL 2017 - HNHU




Comentario: Referente a la condición laboral se observa que el personal CAS presenta un alto porcentaje con 40% (30 casos), debido al estilo de vida o laboran en otros establecimientos de salud, provocándose un desgaste de energía bajo de defensas, en segundo lugar el personal nombrado con 35% (26 casos), Internos de Medicina 14%, médicos residentes de las diferentes especialidades con 8%, tuvieron exposición a la tuberculosis pulmonar o extra pulmonar, motivo que llevo a realizar el despistaje de tuberculosis a todo el personal ver gráfico.

PORCENTAJE DE TUBERCULOSIS SEGUN CONDICION DE ALTA PRIMER SEMESTRE AÑOS 2000 AL 2017 - HNHU




PORCENTAJE DE TUBERCULOSIS SEGUN TIPO DE DIAGNOSTICO PRIMER SEMESTRE AÑO 2000 A 2017 - HNHU.




Comentario: En los años 2000 al 2017, los casos reportados según diagnóstico, la tuberculosis pulmonar 62.7%, en segundo lugar otras formas de tuberculosis como TBC Pleural con 14% seguido por la tuberculosis pulmonar MDR con 20% (15 casos); asimismo se reportaron casos de TB meníngea 2% y TB renal y paucibacilar 0% se sensibiliza al personal para la notificación oportuna de casos y seguimiento estricto del personal afectado, ver gráfico.

CASOS POSITIVOS SEGUN SERVICIO DE PROCEDENCIA- PRIMER SEMESTRE AÑO 2017 HNHU




CASOS DE TUBERCULOSIS SEGUN SEXO REPORTADOS EN EL PRIMER SEMESTRE AÑOS 2000 AL 2017- HNHU




FUENTE: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL (OESA)

TASA DE TUBERCULOSIS EN EL PERSONAL DE SALUD PRIMER SEMESTRE AÑOS 2000 AL 2017 - HNHU



Comentario: En los últimos 4 años la tasa de tuberculosis va en disminución como se puede observar, en el primer semestre el año 2017 la tasa de tuberculosis nosocomial fue de 125.0 (3 casos). Se debe continuar sensibilizando sobre tuberculosis y evaluando para la toma de placas de tórax, BK en esputo y notificación oportuna. La Tasa de tuberculosis en trabajadores se encuentra disminuido para el primer semestre del año 2017 (ver gráfico).


TBC: DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO PRIMER SEMESTRE AÑOS 2000 AL 2017 HNHU



**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE
SALUD (IAAS) – PRIMER SEMESTRE 2017
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
ÁREA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS IAAS**




INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADO A CATÉTER VENOSO CENTRAL - NEONATOLOGÍA - I
SEMESTRE 2014 - 2017-HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área VPC de las IAAS - HHU

COMENTARIO: Se observa en el gráfico que la tasa más elevada del primer semestre 2017, se presenta en mayo con 17.4 X 1000 días de exposición siendo a la vez la tasa más alta desde el 2014; ubicándonos sobre los niveles del promedio general y de hospitales de categoría 3 -1


INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADO A CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO - NEONATOLOGÍA - I SEMESTRE 2014 - 2017 - HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO: El gráfico nos muestra que la tasa de ITS asociado a catéter venoso periférico, ha sufrido un incremento en el mes de enero 2017 con 2 ITS y una tasa de 5.8 X 1000 días de exposición, teniendo luego una notable caída en los últimos cuatro meses del primer semestre, situándonos por debajo del promedio nacional y de hospitales de categoría 3 -1.


NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR MECÁNICO NEONATOLOGÍA - I SEMESTRE 2014 - 2017 --HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO: En el gráfico vemos que desde febrero del 2016 hubo silencio epidemiológico, presentando en junio del 2017 1 NAVM con una tasa de 5.3 X1000 días de exposición, situándonos ligeramente sobre los indicadores de promedio nacional y de hospitales de categoría 3-1.


INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUINEO ASOCIADO A CATETER VENOSO CENTRAL UCI - I SEMESTRE 2014 - 2017 - HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS -HNHU

COMENTARIO: Como se observa, la tasa de ITS asociado a catéter Venoso Central en el primer semestre 2017, luego de un silencio epidemiológico ha presentado 1ITS en junio con una tasa de 5.8 X 1000 días de exposición, situándonos sobre los indicadores de Promedio Nacional y de hospitales de categoría 3-I.


INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO ASOCIADO A CATÉTER URINARIO PERMANENTE UCI - I SEMESTRE 2014 - 2017 - HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO: El gráfico nos muestra que la ITU asociado a catéter urinario permanente, en el primer semestre de los años 2014 y 2015 han tenido un silencio epidemiológico y desde el año 2016 la tasa se ha incrementado, en enero del año 2017 hubo 2 ITU con una tasa de 11.8 X 1000 días de exposición descendiendo hasta el mes de junio; en relación a los indicadores nos encontramos sobre el nivel nacional y de hospitales de categoría de nivel 3-1.


**NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR MECANICO
UCI - I SEMESTRE 2014 - 2017 - HHU**



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HHU

COMENTARIO: Se observa en el gráfico que en el primer semestre 2017, la tasa de NAVM comparativamente con los semestres de años anteriores se ha mantenido elevada y con un marcado descenso; situándonos aún sobre los indicadores de nivel nacional y de hospitales de categoría 3-1.


ENDOMETRITIS PUERPERAL ASOCIADA A PARTO VAGINAL GINECO OBSTETRICIA - I SEMESTRE 2014 - 2017 -HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HN

COMENTARIO: Se observa en el gráfico que el año 2016 ha tenido la mayor ocurrencia de endometritis asociada a parto vaginal, vemos que en el primer semestre del 2017, se han presentado 2 endometritis y las tasas comparativamente con el año anterior no han variado; en relación a los indicadores nos situamos sobre el de nivel nacional y de hospitales de categoría 3-1.


ENDOMETRITIS PUERPERAL ASOCIADA A PARTO CESÁREA GINECO OBSTETRICIA - I SEMESTRE 2014 - 2017 -HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental .Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO: El gráfico nos muestra que la tasa de endometritis asociadas a parto por cesárea, en el primer semestre 2017 comparativamente con los años anteriores se ha elevado, presentando en abril 3 endometritis con una tasa de 1.4 X 100 procedimientos; situándonos frente a los indicadores sobre el de nivel nacional y el de categoría 3-1.


INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA ASOCIADA A PARTO POR CESÁREA GINECO OBSTETRICIA - I SEMESTRE 2014 - 2017 -HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental -Área de VPC de las IAAS- HNHU

COMENTARIO: El gráfico muestra que la IHO asociada a parto por cesárea, en abril del primer semestre 2017 ha presentado 6 IHO con una tasa de 2.8 X 100 procedimientos, con marcado descenso hasta el mes de junio, comparativamente con los semestres de años anteriores presentó la tasa más elevada, en relación a los indicadores nos ubicamos bajo el de nivel nacional y hospitales de categoría 3-1.


INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO ASOCIADO A CATÉTER URINARIO PERMANENTE MEDICINA - I SEMESTRE 2014 - 2017- HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO: Se observa que la ITU asociada a catéter urinario permanente, comparativamente con los años anteriores el primer semestre 2017, presenta la más bajas tasas; nos ubicamos frente a los indicadores bajo el de nivel nacional y hospitales de categoría 3-1.


INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO ASOCIADO A CATÉTER URINARIO PERMANENTE - CIRUGÍA GENERAL - I SEMESTRE 2014 - 2017 - HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología Y Salud Ambiental -Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO: Se observa que la ITU asociada a catéter urinario permanente en el primer semestre del año 2017 después de 5 meses de silencio epidemiológico, en abril ha presentado 1 ITU con una tasa de 6.5 X 1000 días de exposición; frente a los indicadores nos encontramos sobre el de nivel nacional y de hospitales de categoría 3-1. Cabe mencionar que esta infección es el indicador de compromiso de gestión para el año en curso por lo que no puede haber más ITU durante el año para cumplir en la tasa anual con la meta indicada, como dato fue el indicador en el año 2016 y se cumplió la meta de reducir esta infección en 30%.


INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA ASOCIADA A COLECISTECTOMÍA CIRUGÍA GENERAL - I SEMESTRE 2014 - 2017 -HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental - Área de VPC de las IAAS - HNHU

COMENTARIO: El gráfico muestra que la IHO asociada a colecistectomía desde el primer semestre del año 2014 hasta el 2017, se mantiene en silencio epidemiológico; frente a los indicadores nos encontramos bajo el de nivel nacional y hospitales de categoría 3-1.


INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA ASOCIADA A HERNIORRAFÍA INGUINAL - CIRUGÍA GENERAL - I SEMESTRE 2014 - 2017 - HNHU



Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Área de VPC de las IAAS - HNHU


COMENTARIO: El gráfico muestra que la IHO asociada a herniorrafía desde el primer semestre del año 2014 hasta el 2017, se mantiene en silencio epidemiológico; frente a los indicadores nos encontramos bajo el de nivel nacional y hospitales de categoría 3-1.

NÚMERO DE PACIENTES POST QUIRÚRGICOS ATENDIDOS POR MES RELACIONADO CON IHO- CIRUGÍA DE TÓRAX - PRIMER SEMESTRE 2017 - HNHU




COMENTARIO: El gráfico muestra el número de pacientes post quirúrgicos de cada mes del primer semestre 2017, en estos meses la tasa de IHO se mantiene en silencio epidemiológico (0.0%).

**TOTAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR MES
RELACIONADO CON NEUMONÍAS ASOCIADAS A
VENTILADOR MECÁNICO - CIRUGÍA DE TÓRAX -
PRIMER SEMESTRE 2017 -HNHU**




COMENTARIO: El gráfico muestra el número de pacientes hospitalizados en cada mes del primer semestre 2017, en estos meses se observa que en febrero presentó 1 NAVM con una tasa de 3.11 X 1000 días de exposición.

TOTAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR MES RELACIONADO CON NEUMONÍAS NO ASOCIADAS -CIRUGÍA DE TÓRAX - PRIMER SEMESTRE 2017 - HNHU



COMENTARIO: El gráfico muestra el número de pacientes hospitalizados en cada mes del primer semestre 2017, en estos meses se observa que en mayo presentó 1 neumonía no asociada con una tasa de 4.76%.

**INFECCIÓN DE TORRENTE SANGUÍNEO (ITS) ASOCIADO A CATETER VENOSO CENTRAL –
CIRUGÍA DE TÓRAX -
PRIMER SEMESTRE 2017 -HNHU**



COMENTARIO: El gráfico muestra que en abril del primer semestre 2017, se presentó 1 ITS con una tasa de 2.45 X 1000 días de exposición.